

تأثير ضادات الهستامين (الكورفينيرامين و الفيكسوفينادين) على فعالية بعض الانزيمات الكبدية باستخدام نموذج اجنة بيض الدجاج المخصب

سهام عجمي وادي ، محمد خالد شندالة

فرع الفسلجة والكيمياء الحياتية والأدوية ، كلية الطب البيطري ، جامعة الموصل ، الموصل ، العراق

الملخص

كان الهدف من الدراسة الحالية هو الكشف عن تأثير مضادات الهستامين (الكورفينيرامينوالفيكسوفينادين) على بعض المعايير الكيموحيوية للكبد (انزيم الفوسفاتاز القلوية وانزيم الاسبارتيت امينو ترانسفيراز وانزيم الالانين امينو ترانسفيراز) في انسجة اجنة بيض الدجاج المخصب كمؤشر لادى الانسجة . فقد ادى حقن بيض الدجاج المخصبببقار الفيكسوفينادين في اليوم الثاني عشر من الحضنوبالجرع (0,5,0,1)ملغم /بيضة عن طريق الفسحة الهوائية) وبعد مرور 24 ساعة من المعاملة الى احداث انخفاض معنوي في نشاط كل من انزيم الفوسفاتاز القلوية والاسبارتيت امينو ترانسفيراز والالانين امينو ترانسفيراز في انسجة اجنة بيض الدجاج المخصب مقارنة بمجموعة السيطرة وبطريقة معتمدة على الجرعة . احدثت جرعة الكورفينيرامين وبالجرع (0,5,0,1) ملغم / بيضة عن طريق الفسحة الهوائية) وبعد مرور 24 ساعة من المعاملة الى احداث انخفاض معنوي في نشاط كل من انزيمالفوسفاتاز القلوية والاسبارتيت امينو ترانسفيرازفي انسجة اجنة بيض الدجاج المخصب مقارنة بمجموعة السيطرة. في حين لم تحدث جرعة الكورفينيرامين (0,5,0,1) ملغم / بيضة عن طريق الفسحة الهوائية) انخفاض معنوي في نشاط انزيم الالانين امينو ترانسفيراز بالمقارنة مع مجموعة السيطرة. وعند مقارنة تأثير كل من الكورفينيرامين والفيكسوفينادين على بعض المعايير الكيموحيوية فقد احدث الكورفينيرامين انخفاضا معنويا في نشاط انزيم الفوسفاتاز القلوية وانزيم الالانين امينو ترانسفيرازكبير بالمقارنة بالمجاميع المعاملة بالفيكسوفينادين وعند نفس الجرعة . بينما احدث الكورفينيرامين انخفاضا اكبر في مستوى نشاط انزيم الاسبارتيت امينو ترانسفيرازمقارنة بالمجاميع المعاملة بالفيكسوفينادين وعند نفس الجرعة . نستنتج من دراستنا الحالية انضادات الهستامين احدثت تاثيرات مؤذية على انسجة اجنة افراخ الدجاجتمثلت في التغيرات التي احدثتها في نشاط بعض المعايير الكيموحيوية والتي تعتبر كمؤشرللادى الحاصل في الانسجة .

1- المقدمة:

لذلك ظهرت مركبات دوائية تابعة للجيل الثاني من ضادات الهستامين مثل التيرفينادين والفيكسوفينادين، وهي تمتاز بعدم عبورها الحاجز الدموي الدماغي وتخصصها للارتباط بمستقبلات الهستامين [4] وكما هو معروف فقد اثارت ضادات الهستامين الجيل الثاني التيرفينادين ضجة كبيرة وذلك لاحدائه وفيات عديدة ناتجة عن احدائه تأثيرات سمية على عضلة القلب لذلك تقرر سحبه من السوق [5] واستبدل بمركب الفيكسوفينادين والذي يعتبر من النواتج الايضية للتيرفينادين [6-8]. لقد اشار حديثا Ngozika وجماعته في 2012 الى امتلاك ضادات الهستامين الجيل الاول والثاني تأثيرات سمية على الكبد والقلب وقد عزا هؤلاء الباحثين سبب ذلك الى ان ارتباط هذه المركبات الدوائية باواصر هيدروجينية الكترولستاتيكية مع بروتينات الانسجة (الكبد والقلب) محدثة بذلك تاثيرات سمية على هذه الاعضاء [9] ، لذلك كان الهدف من دراستنا الحالية هو دراسة تأثيرات الكورفينيرامين والفيكسوفينادين على بعض المعايير الكيموحيوية (انزيم الفوسفاتاز القلوية وانزيم الاسبارتيت امينو ترانسفيراز وانزيم الالانين امينو ترانسفيراز) حيث تعتبرالتغيرات في نشاط هذه الانزيمات كمؤشر لأدى الانسجة وبأستخدام نموذج اجنة بيض الدجاج المخصب، ولان هذا النموذج يمتلك ميزات عدة منها الحساسية العالية للمركبات الدوائية بالاضافة الى قلة فترة الحضان والتطور السريع وكونها اقتصادية اكثر ولاحتياج الى تكاليف التربية والتغذية والعناية و سهولة التعامل معها السوق [10-11].

تعد ضادات الهستامين (Antihistamines) من المركبات التي تعمل بالتنافس مع الهستامين الطبيعي الموجود بالجسم على الارتباط بالمستقبلات الخاصة بالهستامين والتي تشمل (H4,H3,H2,H1) وخاصة المستقبل H1 وتعمل على غلقه مما يؤدي الى توقف ظهور التأثيرات المحدثة بواسطة الهستامين على الجسم مثل الحساسية والالتهاب [1]. تستخدم ضادات الهستامينسريريا في مجالي الطب البشري والبيطري وذلك بسبب فعلها المضاد للهستامين حيث تعد علاجا فعالا لحالات الحكة المصاحبة للحساسية وفي معالجة التحسس الانفي الفصلي مثل حمى الكأ والتدمع وحكة العينين ومخاطية الانف والشرى المزمنة والتهاب الملتحمة [2].

تعتبر كل ضادات الهستامين شاداتعكسية (Inverse agonist) لمستقبلات الهستامينتقسم ضادات الهستامين للمستقبل (H1) الى جيل اول وهي عبارة عن جزيئات صغيرة محبة للدهون وتمتلك هذه المركبات خصائص منها عبورالحاجزالدموي الدماغي (Blood Brain Barreir) وعدم تخصصها للارتباط بمستقبلاتها مثل التثبيط التنافسي القوي للمستقبل الماسكاريني (Muscarinic receptor) لذلك تسبب تأثيرات انتي كولينرجية (Anticholenergetic effects) و تثبيط مستقبل السيروتونين (Serotonin receptor)والالفا درينيرجيك (Alpha adrenergic receptor) وتسد قنوات الصوديوم (Sodium channeles) ومن امتلتها الكورفينيرامين [3]، وللتقليل من تلك التأثيرات الجانبية المذكورة في اعلاه والناجمة من عدم تخصصها

2- المواد وطرائق العمل

تم في دراستنا الحالية دراسة تأثير ضادات الهستامين (الفيكسوفينادين والكلورفينيرامين) على بعض المعايير الكيموحيوية (انزيم الفوسفاتاز القلوية وانزيم الاسبارتيت امينو ترانسفيراز وانزيم الالنين امينو ترانسفيراز) في انسجة اجنة بيض الدجاج المخصب في اليوم الثاني عشر من الحضن وبالجرج (0,5,0,1 ملغم /بيضة، عن طريق الحقن بالفسحة الهوائية).

استخدم بيض مخصب من نوع روز (308) والتي تم الحصول عليها من مفسس الاخوين في مدينة الموصل وبعمر (5) أيام وتم التأكد من وجود الجنين بواسطة الفحص الضوئي Candling وكان البيض المستخدم بوزن واحد (2±50) غم، تم متابعة الحضن في الحاضنة التابعة لفرع الفسلجة والكيمياء الحياتية والادوية / كلية الطب البيطري / جامعة الموصل بدرجة حرارة (37) م ونسبة رطوبة (60 %) حتى يصل الجنين إلى العمر المطلوب لإجراء التجربة (12) يوماً من الحضن [12-13] قسمت مجاميع التجربة الى (5) مجاميع وبواقع (7) بيضات لكل مجموعة. عقم مكان حقن البيض بالايثانول 70 % ثم حقنت ضادات الهستامين (الفيكسوفينادين والكلورفينيرامين) (الشركة العامة لإنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية / سامراء / العراق) وبجرج (0,5,0,1 ملغم / بيضة عن طريق الفسحة الهوائية) وبجرح جرعة (0,5 مل/بيضة) وحقنت مجموعة السيطرة بالماء المقطر المعقم وكان مكان الحقن في الفسحة الهوائية للبيضة، غلقت الفتحة بواسطة شمع البرافين [14] وجرت عملية الحقن في ظروف معقمة وحضن البيض داخل حاضنة معقمة وبدرجة حرارة (37) م ونسبة رطوبة (60 %)، وبعد مرور (24) ساعة من المعاملة استخرجت البيضة من الحاضنة وكسرت من الجهة العريضة لاستخراج الجنين بالكامل تم وزنه واستخدم في أجزاء التجربة، وقد تمت جميع هذه الخطوات في حجرة الزرع وتحت ظروف معقمة ، وبالاعتماد على طريقة أنور 2003 [15]، أخذ الجنين بالكامل وأجريت عليه عملية استخلاص الإنزيمات منه وذلك عن طريق مجانسته بالكامل (Whole body homogenization) بجهاز الجانسة الكهربائية (Electric homogenizer) وبمساعدة الثلج المجروش وبسرعة (400 دورة/ دقيقة) ولمدة (30 ثانية) وذلك بإضافة (5) مل من محلول الفوسفات الدائري Phosphate buffer (0.2M) لكل (1) غرام من وزن الجنين الكلي للحصول على محلول متجانس وبعدها نقل المحلول إلى أنبوبة اختبار زجاجية نظيفة وتم مزجه بقوة باستخدام جهاز رجاج الانايب (Vortex) ولمدة خمس دقائق، ثم نقلت الانبوبة الزجاجية إلى جهاز الطرد المركزي لمدة عشر دقائق وبسرعة (10000 دورة أدقيقة) حيث أنفصل المحلول إلى طبقتين تم أخذ الطبقة العليا وأهملت الطبقة السفلى وبذلك أصبح جاهزاً لإجراء التجارب عليه الخاصة ببعض المعايير الكيموحيوية . لقد تم حفظ العينات في درجة حرارة (- 18) درجة مئوية لحين إجراء قياس نشاط كل من أنزيم الفوسفاتاز القلوية (ALP) وأنزيم الالنين امينو ترانسفيراز (ALT)، وأنزيم الاسبارتيت

امينو ترانسفيراز (AST)، وبعد (2-3) أيام من إجراء عملية الاستخلاص [16-17] ومن الجدير بالذكر ان التحليلات الكيموحيوية الخاصة بقياس نشاط الانزيمات (ALT، ALP، AST) قد تم اجرائها باستخدام عدة قياس (من إنتاج شركة Biolabo، فرنسا).

3- التحليل الإحصائي Statistical Analysis

تم تحليل البيانات إحصائياً باستخدام اختبار التباين One way Analysis Of Variance (ANOVA) يتبعه اختبار الفرق المعنوي الأدنى Least Significant Difference [18] وكان مستوى المعنوية لجميع الإختبارات $0,05 >$.

4- النتائج

ادى حقن بيض الدجاج المخصب بضاد الهستامين (الكلورفينيرامين) وبالجرج (0,1 و0,5 ملغم / بيضة، الحقن عن طريق الفسحة الهوائية) في اليوم الثاني عشر من الحضن وبعد مرور 24 ساعة من المعاملة الى احداث تغيرات في بعض المعايير الكيموحيوية (انزيم الفوسفاتاز القلوية وانزيم الاسبارتيت امينو ترانسفيراز وانزيم الالنين امينو ترانسفيراز) في انسجة افراخ الدجاج وبطريقة معتمدة على الجرعة تمثل ذلك في الانخفاض المعنوي في نشاط انزيم الفوسفاتاز القلوية في انسجة اجنة افراخ الدجاج وعند الجرعة (0,5 ملغم /بيضة) والتي بلغت (1,80±0,47) بالمقارنة مع المجموعة المعاملة بجرعة (0,1 ملغم /بيضة) والبالغة (2,06±0,59) ومن جهة اخرى فقد اظهرت نتائجنا وجود فرق معنوي بين المجاميع المعاملة بالفيكسوفينادين بجرعة (0,1 و0,5 ملغم / بيضة) مقارنة بمجموعة السيطرة جدول (1).

ومن الجدير بالذكر ان هذا الانخفاض المعنوي في نشاط هذا الانزيم كان على اشده حيث انخفضت قيمة نشاطه بمعدل اقل باربع او خمس مرات (Fold) مقارنة بمجموعة السيطرة حيث انخفض نشاط هذا الانزيم من (10,26±0,66) لمجموعة السيطرة الى (2,06±0,59) و (1,80±0,47) في المجاميع المعاملة (0,5,0,1 ملغم / بيضة) على التوالي.

احداثت جرح الكلورفينيرامين (0,5,0,1 ملغم / بيضة) انخفاض معنوي في نشاط انزيم الاسبارتيت امينو ترانسفيراز في انسجة اجنة بيض الدجاج المخصب مقارنة بمجموعة السيطرة كما اظهرت هذه المجاميع انخفاض معنوي في نشاط هذا الانزيم في الجرعة (0,5 ملغم / بيضة) مقارنة مع الجرعة (0,1 ملغم / بيضة).

وفيما يخص نشاط انزيم الالنين امينو ترانسفيراز فقد انخفض نشاط هذا الانزيم في المجاميع المعاملة (0,1,0,5) بالمقارنة مع مجموعة السيطرة في حين لم يلاحظ فروقات معنوية بين المجاميع (0,5, 0,1 ملغم / بيضة).

ادى حقن بيض الدجاج المخصب بضاد الهستامين (الفيكسوفينادين) وبالجرج (0,1 و0,5 ملغم / بيضة، الحقن عن طريق الفسحة الهوائية) في اليوم الثاني عشر من الحضن وبعد مرور 24 ساعة من المعاملة الى احداث تغيرات في بعض المعايير الكيموحيوية (انزيم الفوسفاتاز القلوية وانزيم الاسبارتيت امينو ترانسفيراز) في انسجة افراخ الدجاج

0,5 ملغم / بيضة) مقارنة مع الجرعة (0,1 ملغم/بيضة). وفيما يخص نشاط انزيم الانلين امينو ترانسفراز لم تظهر المجاميع المعاملة بالفيكسوفينادين وبالجرع (0,5,0,1 ملغم / بيضة) اي فروقات معنوية سواء بالمقارنة مع مجموعة السيطرة او بين المجاميع جدول (1). وعند مقارنة تأثير الكلورفينيرامين على بعض المعايير الكيموحيوية (انزيم الفوسفاتاز القلوية وانزيم الاسبارتيت امينو ترانسفراز وانزيم الانلين امينو ترانسفراز) مع الفيكسوفينادين فقد اظهرت نتائج دراستنا الحالية وجود انخفاض معنوي اكبر في نشاط كل من انزيم الفوسفاتاز القلوية وانزيم الانلين امينو ترانسفراز في المجاميع المعاملة بالكلورفينيرامين (0,5,0,1 ملغم/بيضة) بالمقارنة مع المجاميع المعاملة بالفيكسوفينادين (0,5,0,1 ملغم/بيضة). في حين احدثت هذه الجرعة من الكلورفينيرامين انخفاض معنوي اكبر في نشاط انزيم الاسبارتيت امينو ترانسفراز مقارنة بالمعاملة بالفيكسوفينادين وبنفس الجرعة.

وبطريقة معتمدة على الجرعة تمثل ذلك في الانخفاض المعنوي في نشاط انزيم الفوسفاتاز القلوية في انسجة اجنة افراخ الدجاج المعاملة بهذا العقار وجرعة (0,5 ملغم/بيضة) والتي بلغت ($0,61 \pm 3,40$) مقارنة بجرعة (0,1 ملغم/بيضة) وبالبلغة ($0,26 \pm 5,77$). كما اظهرت المجاميع المعاملة بالجرع (0,5,0,1 ملغم/بيضة) انخفاض معنوي في نشاط هذا الانزيم في انسجة اجنة افراخ الدجاج بالمقارنة مع مجموعة السيطرة حيث انخفض نشاط هذا الانزيم من ($10,26 \pm 0,66$) في مجموعة السيطرة الى ($0,26 \pm 5,77$) و ($0,61 \pm 3,40$) في المجاميع المعاملة بجرعة (0,5,0,1 ملغم / بيضة) على التوالي حيث كان هذا الانخفاض بمعدل ضعفين او ثلاثة اضعاف مقارنة بمجموعة السيطرة. وفيما يخص انزيم الاسبارتيت امينو ترانسفراز فقد احدثت جرعة الكلورفينيرامين (0,1,0,5 ملغم / بيضة) انخفاض معنوي في نشاط هذا الانزيم مقارنة بمجموعة السيطرة اضافة الى ذلك فقد ظهر انخفاض معنوي في نشاط هذا الانزيم بالمجموعة المعاملة بجرعة

جدول (1) تأثير ضادات الهستامين (الكلورفينيرامين والفيكسوفينادين) على فعالية بعض الانزيمات في انسجة اجنة بيض الدجاج المخصب

المجاميع المعاملة (ملغم / بيضة)	انزيم الاسبارتيت امينو ترانسفراز وحدة دولية / غرام	انزيم الانلين امينو ترانسفراز وحدة دولية / غرام	انزيم الفوسفاتاز القلوية وحدة دولية / غرام
مجموعة السيطرة	$0,34 \pm 302,90$	$0,49 \pm 12,19$	$0,66 \pm 10,26$
الكلورفينيرامين 0,1	$0,12 \pm 178,60$ *	$0,21 \pm 10,61$ *	$0,59 \pm 2,06$ *
الكلورفينيرامين 0,5	$0,31 \pm 171,60$ *	$0,24 \pm 10,56$ *	$0,47 \pm 1,80$ *
الكلورفينيرامين 0,1	$0,87 \pm 198,80$ أ,ب	$0,21 \pm 12,02$	$0,26 \pm 5,77$ أ,ب
الكلورفينيرامين 0,5	$0,10 \pm 195,60$ أ,ب,ج	$0,28 \pm 11,65$ *	$0,61 \pm 3,40$ أ,ب,ج

القيمة تمثل المعدل \pm الخطأ القياسي (7 بيضات / مجموعة).

*القيمة تختلف معنويا مقارنة بقيمة مجموعة السيطرة وعند مستوى معنوية اقل من 0,05 .

أ- القيمة تختلف معنويا مقارنة بقيمة جرعة الكلورفينيرامين (0,1 ملغم / بيضة) وعند مستوى معنوية اقل من 0,05 .

ب- القيمة تختلف معنويا مقارنة بقيمة جرعة الكلورفينيرامين (0,5 ملغم / بيضة) وعند مستوى معنوية اقل من 0,05 .

ج- القيمة تختلف معنويا مقارنة بقيمة جرعة الفيكسوفينادين (0,1 ملغم/بيضة) وعند مستوى معنوية اقل من 0,05.

5- المناقشة

الانخفاض المعنوي في نشاط هذه الانزيمات (الفوسفاتاز القلوية وانزيم الاسبارتيت امينو ترانسفراز وانزيم الانلين امينو ترانسفراز) في انسجة الكبد والذي عزاها الباحث الى التأثيرات السمية على انسجة الكبد مما ادى الى تحطم هذه الخلايا وتحرر الانزيمات الى مجرى الدم وارتفاع مستوياتها فيه مما ادى الى انخفاض مستوياتها في الانسجة [19-21]. لقد سجل انزيم الفوسفاتاز القلوية انخفاضا كبيرا في انسجة اجنة بيض الدجاج المخصب المعاملة بالكلورفينيرامين وبالجرع (0,5,0,1 ملغم / بيضة) في الفسحة الهوائية) وكان الانخفاض بمعدل من اربعة الى خمسة اضعاف مقارنة بمجموعة السيطرة يؤشر هذا الانخفاض الكبير في نشاط هذا الانزيم على مدى الاذى الذي احدثه الكلورفينيرامين على الانسجة وكما هو معروف ان هذه الانزيم يوجد في خلايا الأمعاء والكبد والكلية والعظام والمشيمة [22] لذلك فمن المحتمل ان

لقد كان الهدف من دراستنا الحالية هو استخدام التغير في نشاط بعض الانزيمات مثل انزيم (الفوسفاتاز القلوية و الاسبارتيت امينو ترانسفراز الانلين امينو ترانسفراز) كمؤشر لاذى الانسجة نتيجة استخدام ضادات الهستامين الكلورفينيرامين والفيكسوفينادين, فقد ادى حقن عقار الكلورفينيرامين بجرعة (0,5,0,1 ملغم / بيضة) في الفسحة الهوائية) ويعمر 12 يوم من الحضان وبعد مرور 24 ساعة الى احداث انخفاض معنوي في نشاط انزيم كل من (الفوسفاتاز القلوية وانزيم الاسبارتيت امينو ترانسفراز وانزيم الانلين امينو ترانسفراز) في انسجة اجنة بيض الدجاج المخصب بالمقارنة مع مجموعة السيطرة وقد يعزى هذا الانخفاض الى تأثير العقار على الانسجة مما ادى الى تحرر هذه الانزيمات الى البلازما وانخفاض مستوياتها بالانسجة وبذلك تكون متفقة مع ما أشار اليه الباحث Maciejewska وجماعته في 2007 حول

للانسجة الى قدرة هذه المركبات على احداث الاجهاد التأكسدي بهذه الجرعة مما يؤدي الى زيادة في انتاج اصناف الاوكسجين الفعالة Reactive oxygen species [23] ومما يؤكد هذا التفسير هو ان الهستامين الموجود بشكل طبيعي بالجسم يعمل كمثبط صماوي ذاتي لاصناف الاوكسجين الفعالة ولان مركبات الفيكسوفينادين والكلورفينيرامين تعتبر من ضادات الهستامين والتي تثبط فعل الهستامين وبالتالي على فعالية الهستامين المضادة للاكسدة [24].

اثبتت نتائج الدراسة الحالية ان الانخفاض المعنوي في نشاط الانزيمات (الفوسفاتاز القلوية و انزيم الالنين امينوترانسفيراز وانزيم الاسبارتيت امينو ترانسفيراز) كان معتمدا على الجرعة (Dose dependent) في المجاميع المعاملة سواء بالكلورفينيرامين او الفيكسوفينادين ويمكن تفسير ذلك هو انه عند زيادة الجرعة ادى الى تعرض اجنة بيض الدجاج المخصب الى جرعة اعلى لذلك كانت مساحة الانى اكبر مما ادى الى تحرر كميات اكبر من الانزيمات الى البلازما وانخفاض مستواها في الانسجة مقارنة بالجرع الاقل.

لقد اثبتت نتائج دراستنا الحالية الحساسية العالية الذي يمتلكها نموذج اجنة بيض الدجاج المخصب لضادات الهستامين (الكلورفينيرامين والفيكسوفينادين) تمثل ذلك في التغيرات التي احدثتها هذه المركبات في نشاط انزيم (الفوسفاتاز القلوية و الاسبارتيت امينو ترانسفيراز والالنين امينوترانسفيراز) متفقة مع ماتوصل اليه الباحث Vargas وجماعته في 2007 وكذلك الباحث Uggin وجماعته في 2011 حول امتلاك هذا النموذج الحساسية العالية للمركبات الدوائية [25]. بالاضافة الى ان هذا النموذج يمتلك التأثير المباشر لضادات الهستامين على الجنين نفسه وبذلك سوف نستبعد تأثير تداخل عامل الام كما في الثدييات [26].

هذا العنصر احدث اذى لهذه الانسجة مما ادى الى تحرر هذا الانزيم بالبلازما وانخفاض مستواه في الانسجة .

لقد اظهرت المجاميع المعاملة بالكلورفينيرامين وبالجرع (0,5,0,1 ملغم / بيضة, في الفسحة الهوائية) انخفاضا معنويا في قيمة نشاط انزيم (الفوسفاتاز القلوية وانزيم الاسبارتيت امينو ترانسفيراز) وقد يعزى هذا الانخفاض الى تأثير هذا العنصر على انسجة اجنة بيض الدجاج المخصب ومما يؤكد هذا الاستنتاج ماتوصل اليه الباحث حديثا Ngozika وجماعته في 2012 بأن هذا العنصر يملك تأثيرات سمية على خلايا الكبد والقلب مما يؤدي الى تحرر الانزيمات الى مجرى الدم وانخفاض مستواها بالانسجة [9].

وعند مقارنة تأثير كل من الكلورفينيرامين والفيكسوفينادين على نشاط الانزيمات (الفوسفاتاز القلوية و انزيم الالنين امينوترانسفيراز وانزيم الاسبارتيت امينو ترانسفيراز) فقد اظهرت نتائج هذه الدراسة بأن تأثير الكلورفينيرامين كان هو الاشد على احداث تأثيرات مؤذية على الانسجة تمثل ذلك بالانخفاض المعنوي الكبير في نشاط انزيم الفوسفاتاز القلوية وبخمس اضعاف مقارنة بمجموعة السيطرة بينما كان الانخفاض في نشاط هذا الانزيم في المجاميع المعاملة بالفيكسوفينادين حوالي ضعفين مقارنة بمجموعة السيطرة بالاضافة الى ذلك فان الكلورفينيرامين احدث انخفاضا معنويا في قيمة نشاط انزيم الالنين امينو ترانسفيراز في حين لم ذلك بالمجاميع المعاملة بالفيكسوفينادين . وقد يعزى الانخفاض المعنوي في نشاط هذه الانزيمات في انسجة اجنة بيض الدجاج الى ان ضادات الهستامين (الكلورفينيرامين والفيكسوفينادين) احدثت اذى لهذه الانسجة مما ادى الى تحررها الى البلازما وانخفاض مستواها بالانسجة وقد يعزى هذا التأثير المؤذي

المصادر

- Bertram G. Katzung. Basic and clinical pharmacology. 16thed., Mc Graw – Hill companies, Inc., United States of America. 2009 ; 271-275.
- Lorenz, P.T... Dogs electrocardiography, translated by Rezakhani, A. Shiraz, Shira Z University publication, 2000; 21(25),39-64.
- Simon F.E.R. Advanced in H1 Antihistamines N. Engl. J. Med., 2004; 351(21). 2203-2217.
- AHFS Drug Information.. American Society of Health–System Pharmacists, Bethesda, Md. 2000. pp:2-45.
- Leurs R, Church MK and Taglialatela M. Antihistamines: inverseagonism, anti-inflammatory action and cardiac effects. Clin. Expresed Allerge. 2000;32,489-498.
- Salata, J.J., Jurkiewicz A.A. Wallace, R.F. Stupienski. P.J. Jr. Guinosso and. Lynch J.J. Cardiac electrophysiological actions of the histamine H1 receptor antagonists astemizole and terfenadine compared with chlorpheniramine and pyrilamine. Circ. Res.1995;76:110-119.
- Barbey JT, Anderson M, Ciprandi G, Frew AJ, Morad M and Priori SG. Cardiovascular safety of second-generation antihistamines. Am J Rhinol.1999; 13:235-43.
- Pratt C, Brown AM, Rampe D, Mason J, Russell T and Reynolds. Cardio vascular safety of fexofenadine HCL. Am J cardiol. 1999; 83: 1451-4.
- Ngozika BO, Monago C, Austin A U, Chineye JI and Chukwubuike UO. (2012). Effects of some anti-histamine on erythrocyte aspartate amino transferase and alanine amino transferase activities in Wister albino rats.Ind J. Sci and Tec .2012; 5(7).3001-3304.
- Vinardell, M. P. and Mitjans, M. The chorioallantoic membrane test as a model to predict the potential human eye irritation induced by commonly used laboratory solvent . Toxicol. In Vitro.2006; 20: 1066- 1070.
- Bhanushali, M., Bagale, V., Shirode, A., Joshi, Y. and Kadam, V.. An in- vitro toxicity testing – reliable alternative to toxicity testing by reduction, replacement and refinement of animals. Inter. J. Adv. Pharma. Sci. 2010; 1 : 15-13.
- Saw, C.L.L., Olivo, M., Chin, W.W.L., Soo, K.C. and Heng, P.W.S. Transport of hypericin across chick chorioallantoic membrane and photodynamic therapy

- vasculature assessment. Biol. Pharm. Bull.2005; 28: 1054-1060.
13. Vargas, A., Zeisser - Labouèbe, M., Lange, N., Gurny, R. and Delie. F. The chick embryo and its chorioallantoic membrane (CAM) for the in vivo evaluation of drug delivery systems. *Advanced Drug Delivery Reviews*.2007; 59:1162–1176.
14. Pushpanjali, A.K., Pal, R. L., Parsad, S. K., Singh, A. and Kumar, S. B. J. In ovoembryotoxicity of α -endosulfan adversely influence liver and metabolism and the immune system in chickens. *pestic. Biochem. Physiol*.2005 ; 82: 103- 114.
15. Anwer, K. Cypermethrin a Pyrethroid insecticide induces v teratological and biochemical changes in young chick embryos. *Pakistan J. Bio. Sci*. 2003; 19: 1698-1705.
16. Anwer, K. Toxic Effects of Cypermethrin on the Development of Muscle in Chick Embryo of *Gallus domesticus*.*Inter. J. Agre. Bio*. 2004; 2:400–406.
17. Sudhakar, D., Kishore, R. K. and Parthasarathy, P. R. Portulacaoleracea L. extract ameliorates the cisplatin- induced toxicity in chick embryonic liver. *Ind. J. Bioch. Biophys*.2010 ; 47: 185-189.
- 18- التحليل الإحصائي المتقدم باستخدام جودة 2008، محفوظ. دار الأوتائل للنشر. الطبعة الأولى عمان، الأردن spss.
19. Maciejewska. Paszek I., Pawlowska–Goral K.,Kostrzewski M.,Kurzeja E., Wardas M., Rzepecka Stojko A. The inflence of small doses of paracetamol on rabbit liver. *Exp . Toxicol*. 2007;59(2):139-141.
20. Masaki T., Chiba S., Tatsukawa H., Noguchi H., Kakuma T., Endo M., Watanabe T., Yoshimastu H. The role of histamine H1 receptor and H2 receptor in LPS - induced liver injury. *FASEB J*. 2005;19 (10): 1245 -1252.
21. Thapa B.R., Walia A. Liver function tests and their interpretation. *Indian J. Pediator*. 2007; 74(7) pp. 663-671.
22. Hasan FAM,Owyed S . Interpretation of liver chemistry tests.*Bull Kuwait Inst. Med. Spec*. 2003, 2:27-31.
23. Cheng, F.C., Jen, J.F. and Tsai, T.H. Hydroxyl radical in living systems and its separation methods .*J.chromatography*. 2002,781(1-2):481-496.
24. Mellqvist U H, Hansson M, Burne M, Dahlgren C,Hermodsson S and Hellstrand K. Natural killer cell dysfunction and apoptosis induced by chronic myelogenous leukemia cells: role of reactive oxygen species and regulation by histamine .2000,8;96.
25. Uggin., GiK., Patel, P.V. and Balakrishuan,S. Embriotoxic and teratogenic effects of pesticides in chick embros: Acomparative study using two commercial formulations .*Environ .Toxicol*.2011, doi:10.1002 Hox.20627.
26. Yanai, J., Pinkas, A., Seidler, F., Ryele., Van der Zee, E.and Slotkin, T. 2009. Neurobehavioral treatogenicty of sarin in an avian model .*Neurotoxicol. Teratol*, 31:1092-197.

Effect of Antihistamines (Fexofenadine and Chlorpheniramine) on activity some hepatic enzymes by using fertilized hens eggs embryos as a model

Siham Agmee Wadee, Mohammad Kaled Shindala

Department of Physiology Biochemistry and Pharmacology, College of Veterinary Medicine, University of Mosul, Mosul, Iraq

Abstract

The aim of the present study was to investigate the effect of antihistamines (Chlorpheniramine and Fexofenadine) on (alkaline phosphatase, aspartate amino transferase and alanine amino transferase) in tissue of fertilized hens eggs embryos as indicator to tissue damage. The injection of fertilized hen's eggs with antihistamines Fexofenadine at 12th day of incubation in doses (0,5,0,1mg/ egg into air cell) after 24 hours of treatment induced significantly decrease in tissues activity of alkaline phosphatase (ALP), aspartate amino transferase (AST) and alanine amino transferase (ALT) compared with control group in a dose-dependent manner. Injection of Chlorpheniramine at dose (0,5,0,1 mg/egg into air cell) induced significantly decrease in tissues activity of alkaline phosphatase and aspartate amino transferase compared with control group, but no significant decrease in tissue activity of alanine amino transferase (ALT) at dose (0,5,0,1mg/egg) compared with control group. Compare the effect of Chlorpheniramine and Fexofenadine on some biochemical parameters, chlorpheniramine caused a significant decrease in tissues activity of alkaline phosphatase (ALP) and alanine amino transferase (ALT) larger than the group which treated with fexofenadine in the same dose, also chlorpheniramine caused a significant decrease in tissues activity of aspartate amino transferase larger than the group which treated with fexofenadine in same dose. We conclude the antihistamines have harmful effects to tissues of chick embryos represented by the changes in activity of some biochemical parameter which its consider as a marker for damage this tissue.